Portfólio de SOJA

Safra 2026- 2027

POLATO

A semente da produtividade.

Controle total dos seus pedidos, onde você estiver.

Clique nos ícones e
baixe o nosso aplicativo.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SUMÁRIO

CULTIVARES NEOGEN

NEO 690 i2X 5
NEO 700 i2X 6
NEO 720 i2X 7
NEO 750 iPRO 8
NEO 761 i2X 9
NEO 771 i2X 10
NEO 780 CE 11
NEO 790 iPRO 12
NEO 800 i2X 13
NEO 801 CE 14
NEO 802 i2X 15
NEO 810 i2X 16
NEO 811 i2X 17
NEO 820 iPRO 18
NEO 821 i2X 19

CULTIVARES STINE

STINE 76KA72 29
STINE 79KA72 30
STINE 84KA92 31

CULTIVARES SOYTECH

ST 711i2X 32
ST 745 i2X 33
ST 807 i2X 34

CULTIVARES CORDIUS

C2740 CE 20
C2810 CE 21

SOY GENÉTICA

SOY COMPLETA iPRO 22

CULTIVARES TMG

TMG 2370 iPRO 23
TMG 22E70 CE 24
TMG ITAÚBA i2X 25
TMG BÁLSAMO i2X 26
TMG BRAÚNA i2X 27
TMG INGA i2X 28
TMG SUCUPIRA E 29

GANORA SEMENTES

GAN 760X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Precocidade;
- Permite abertura de plantio;
- Rápido desenvolvimento inicial.

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita; Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 3 e 10:	R
Cisto raça 14:	MR
Galha:	S

DOENÇAS	Resistência
Fitóftora:	R
Mancha "olho-de-rã":	MR
Pústula bacteriana:	R
Mancha-alvo:	SI

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação:	7.6
Porte:	Médio/Alto
Hábito de crescimento:	Indeterminado
STS:	Não é STS
Peso de mil grãos:	181 g

** É considerado resistente quando IF < 10% . Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REC	SEGMENTO FOCO	POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (x1.000 PLANTAS/HA)								
		SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO		
		01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
401	GRANDE PRIMAVERA		260-280	240-280	240-260	240-260	240-260			
401	MT SUL		240-280	240-260	240-260	240-260	240-260			
402	BR 163		260-300	260-300	260-300	260-300	240-280			
402	PARECIS		260-300	260-300	260-300	260-300	240-280			
402	RONDÔNIA				240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	
403	VALE DO ARAGUAIA				300-320	300-320	280-300	280-300	280-300	280-300

RECOMENDADO · TOLERADO

neogen

neo690 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Amplia a janela de plantio da 2ª safra;
- Resistente a cisto raça 3 e moderadamente resistente a cisto raças 6, 10, 14 e 14+; e
- Resistência à podridão radicular de Phytophtora raça 1.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**6.9**
Exigência à fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**175 g**
Ramificação	**Média**

REGIÕES	CICLO (DIAS)	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
DF Irrigado 304	105	280-340 mil
DF Sequeiro 304	105	300-380 mil
GO Sudoeste 301	104	300-380 mil
GO Sudoeste e Sul 302	99	300-380 mil
GO Centro Sul 303	111	260-340 mil
GO Leste (irrigado) 304	105	280-340 mil
GO Leste (sequeiro) 304	105	300-380 mil
MG Sul 302	128	240-300 mil
MG Pontal 302	111	260-340 mil
MG Alto Paranaíba 303	111	260-340 mil
MG Triângulo 303	111	260-340 mil
MG Noroeste (irrigado) 304	105	280-340 mil
MG Noroeste (sequeiro) 304	105	300-380 mil
MS Norte 301	104	300-380 mil
SP Norte 302	111	260-340 mil

neogen

neo700 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Precocidade;
- Resistente a Nematoide de Cisto (raça 3); e
- Mod. Resistente a Nematoide de Cisto (raças 6, 9, 10, 14 e 14+).

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.0**
Peso de mil grãos	**176 g**
Tolerante a sulfonilureias STS ™ 4	**Sim**
Potencial de ramificação	**Médio**
Exigência à fertilidade	**5 (alta)**

REGIÕES	CICLO[1] (DIAS[2])	POPULAÇÃO[3] (PLANTAS/HA)
GO Sudoeste 301	105	260-320 mil
MS Norte 301	105	260-320 mil
GO Sudoeste e Sul 302	102	260-320 mil
MG Pontal 302	111	220-280 mil
SP Norte 302	111	220-280 mil
GO Centro Sul 303	111	220-300 mil
MG Alto Paranaíba 303	111	220-300 mil
MG Triângulo 303	111	220-300 mil
DF (irrigado) 304	104	260-300 mil
DF (sequeiro) 304	104	260-320 mil
GO Leste (irrigado) 304	104	260-300 mil
GO Leste (sequeiro) 304	104	260-320 mil
MG Noroeste (irrigado) 304	104	260-300 mil
MG Noroeste (sequeiro) 304	104	260-320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas.

[2]Dias após a emergência.

[3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

4STS™ é uma marca registrada da DuPont™ de Nemours and Company ou de suas afiliadas e é utilizada
sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.

neogen

neo720 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Responsiva em condições de alta fertilidade;
- Porte controlado.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto Raça 3	S
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha olho-de-rã	MR
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.2 (M3) 7.4 (MT)**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**171 g**
Ramificação	**Baixa**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

- S Suscetível
- MT Moderadamente Tolerante
- T Tolerante
- MR Moderadamente Resistente
- R Resistente
- MS Moderadamente Suscetível
- SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M3 301	109	300-350 mil
M3 302	101	300-350 mil
M3 303	113	250-300 mil
M3 302 e 303 (Sul MG)	121	220-280 mil
M3 304 (Sequeiro)	108	300-350 mil
M3 304 (Irrigado)	108	280-320 mil
M4 401 (Centro-Oeste GO)	108	300-350 mil
M4 401 (Sul MT)	102	350-400 mil
M4 402 C (Médio-Norte MT)	100	350-420 mil
M4 402 O (Oeste MT)	100	350-420 mil
M4 402 RO (até 400m de altitude)	100	280-350 mil
M4 402 RO (acima de 400m de altitude)	100	350-420 mil
M4 403 (Vale do Araguaia MT)	102	350-420 mil
M4 404 (Norte GO)	108	350-400mil

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência

neogen

neo750 iPRO

INTACTA RR2 PRO™

PONTOS FORTES

- Elevado potencial produtivo;
- Boa sanidade de grãos; e
- Resistência a nematóide de cisto.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 6	MR
Cisto raça 9	MR
Cisto raça 10	MR
Cisto raça 14	MR
Cisto raça 14+	MR
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da Haste	**R**
Mancha olho-de-rã	**S**
Pústula bacteriana	**R**

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.5**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**162 g**
Ramificação	**Baixa**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M3 301	113	280-320 mil
M3 302	105	280-320 mil
M3 303	120	250-300 mil
M3 302 e 303 (Sul MG)	130	250-280 mil
M3 304 (Sequeiro)	111	280-320 mil
M3 304 (Irrigado)	111	280-300 mil
M4 401 (Centro-Oeste GO)	113	280-320 mil
M4 401 (Sul MT)	106	350-400 mil
M4 402C (Médio-Norte MT)	98	350-400 mil
M4 402 O (Oeste MT)	100	350-400 mil
M4 402 RO (até 400m de altitude)	104	250-320 mil
M4 402 RO (acima de 400m de altitude)	104	350-400 mil
M4 403 (Vale do Araguaia MT)	100	350-400 mil
M4 404 (Norte GO)	112	280-350 mil
M4 405 (Oeste BA Irrigado)	107	320-400 mil
M4 Transição 404 TO e 501 TO	100	380-420 mil
M5 501 (Campos Lindos/TO e da Batavo/MA)	99	350-420 mil
M5 501 (PA)	103	350-420 mil
M5 502 (PA)	97	350-420 mil

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

neogen

neo761 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Amplia a janela de plantio da segunda safra; e
- Nova tecnologia associada à resistência a cisto.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 6	MR
Cisto raça 9	MR
Cisto raça 10	MR
Cisto raça 14	MR
Cisto raça 14+	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.6**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**186 g**
Ramificação	**Baixa**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
Sul MT 401	102	320-380 mil
Médio-Norte MT 402	99	350-400 mil
Oeste MT 402	102	350-400 mil
Vale do Araguaia 403	100	350-400 mil
Alta RO (acima 400m altitude) 402	102	350-400 mil
Baixa RO (abaixo 400m altitude) 402	101	250-320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neogen

neo771 i2X

INTACTA 2 XTEND

CISTO — CULTIVAR RESISTENTE

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Precocidade;
- Resistente a cisto raça 3; e
- Moderadamente resistente a cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+	MR
Galha	S

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.7**
Peso de mil grãos	158 g
Potencial de ramificação	Baixo
Exigência de fertilidade	5 (alta)

S Suscetível — MT Moderadamente Tolerante — R Resistente — MS Moderadamente Suscetível

T Tolerante — MR Moderadamente Resistente — SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO[1] (DIAS[2])	POPULAÇÃO[3] (PLANTAS/HA)
MT Sul	112	280-350 mil
MT Médio-Norte	105	300-350 mil
MT Oeste	105	300-350 mil
RO (abaixo de 400m)	105	250-300 mil
RO (acima de 400m)	105	300-350 mil
MT Vale do Araguaia	104	300-350 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas.

[2]Dias após a emergência.

[3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neogen

neo780 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

CULTIVAR RESISTENTE CISTO CULTIVAR RESISTENTE

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Boa uniformidade e estrutura de planta;
- Porte e ciclo adequados ao cerrado;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.8**
Ciclo médio	**110 dias de emergência***
Hábito de crescimento	**Indeterminado**
Peso de mil grãos	**158 g**
Porte médio	**83 cm**
Ramificação	**Médio**
Exigência de fertilidade	**4**

LANÇAMENTO

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 6, 9, 10, 14, 14+	MR
Galha	S

S Suscetível
T Tolerante
R Resistente
SI Sem Informação
MT Moderadamente Tolerante
MR Moderadamente Resistente
MS Moderadamente Suscetível

REGIÕES	ÉPOCA DE PLANTIO	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401 MT	01/10 A 25/11	280-320 MIL
402-C MT	01/10 A 25/11	280-350 MIL
402-O MT	01/10 A 25/11	280-350 MIL
403 MT	20/10 A 30/11	280-350 MIL

neogen

neo790 iPRO

INTACTA RR2 PRO™

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade; e
- Ampla região de adaptação.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto	S
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha olho-de-rã	MS
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.9**
Exigência de fertilidade	**4 (alta)**
Peso de mil grãos	**168 g**
Ramificação	**Média**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M4 401 (Sul MT)	110	250-320 mil
M4 402 C (Médio-Norte MT)	107	280-350 mil
M4 O (Oeste MT)	107	280-350 mil
M4 402 RO (até 400m de altitude)	109	200-280 mil
M4 402 RO (acima de 400m de altitude)	109	280-350 mil
M4 403 (Vale do Araguaia MT)	111	280-350 mil

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

neogen

neo800 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo; e
- Ideal para ambientes de alta fertilidade.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.0**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**163 g**
Ramificação	**Média**

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
MT Sul 401	124	250-300 mil
MT Médio-Norte 402	112	250-320 mil
MT Oeste 402	115	250-320 mil
MT Vale do Araguaia 403	112	250-320 mil
RO Abaixo de 400m 402	117	200-280 mil
RO Acima de 400m 402	115	250-320 mil

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

neogen

neo801 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

CISTO CULTIVAR RESISTENTE

PONTOS FORTES

- Boa opção para manejo de ervas de difícil controle;
- Ideal para ambientes de alta fertilidade;
- Resistente a cisto raça 3; e Moderadamente resistente a cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raças 6, 9, 10, 14 e 14+	MR
Galha	S

CARACTERÍSTICAS	
Grupo de maturação	**8.0**
Peso de mil grãos	156 g
Potencial de ramificação	Médio
Exigência de fertilidade	5 (alta)

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível

T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO[1] (DIAS[2])	POPULAÇÃO[3] (PLANTAS/HA)
MT Sul	117	250-320 mil
MT Médio-Norte	111	280-320 mil
MT Oeste	113	280-320 mil
RO (abaixo de 400m)	113	220-280 mil
RO (acima de 400m)	113	280-320 mil
MT Vale do Araguaia	110	280-320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. [2]Dias após a emergência. [3]Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas.

neogen

neo810 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Crescimento vegetativo vigoroso;
- Resistente a cisto raças 3; e
- Moderadamente resiste a cisto raças 9, 10 e 14.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 9	MR
Cisto raça 10	MR
Cisto raça 14	MR
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha olho-de-rã	MS
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.1**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**162 g**
Ramificação	**Média**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M4 401 MT Sul	123	250-320 mil
M4 402 RO Baixa (até 400m de altitude)	112	200-280 mil
M4 402 RO Alta (acima 400m de altitude)	112	280-350 mil
M4 402 C MT Médio-Norte	111	280-350 mil
M4 402 O MT Oeste	111	280-350 mil
M4 403 MT Vale do Araguaia	117	280-350 mil
M4 404 Transição 404 TO e 501 TO	110	240-320 mil
405 BA Oeste – Irrigado	121	180-250 mil
405 BA Oeste – Sequeiro	119	220-300 mil
501 Campos Lindos TO e Batavo MA	109	240-320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

neogen

neo810 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Crescimento vegetativo vigoroso;
- Resistente a cisto raças 3; e
- Moderadamente resiste a cisto raças 9, 10 e 14.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 9	MR
Cisto raça 10	MR
Cisto raça 14	MR
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha olho-de-rã	MS
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.1**
Exigência de fertilidade	**5 (alta)**
Peso de mil grãos	**162 g**
Ramificação	**Média**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M4 401 MT Sul	123	250-320 mil
M4 402 RO Baixa (até 400m de altitude)	112	200-280 mil
M4 402 RO Alta (acima 400m de altitude)	112	280-350 mil
M4 402 C MT Médio-Norte	111	280-350 mil
M4 402 O MT Oeste	111	280-350 mil
M4 403 MT Vale do Araguaia	117	280-350 mil
M4 404 Transição 404 TO e 501 TO	110	240-320 mil
405 BA Oeste – Irrigado	121	180-250 mil
405 BA Oeste – Sequeiro	119	220-300 mil
501 Campos Lindos TO e Batavo MA	109	240-320 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

neogen

neo811 i2X

INTACTA 2 XTEND STS™

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Resistência a nematoide de galha;
- Resistência a nematoide de cisto.

LANÇAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	8.1 BA
Ciclo médio	116 dias de emergência*
Hábito de crescimento	Indeterminado
Peso de mil grãos	178 g
Porte médio	98 cm
Ramificação	Médio
Exigência de fertilidade	4

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raça 6, 9, 10, 14, 14+	MR
Galha M. incognita	MR

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	ÉPOCA DE PLANTIO	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
405 BA IRRIGADO	25/09 A 30/11	160-220 MIL
405 BA SEQUEIRO	25/10 A 30/11	180-260 MIL

neogen neo820 iPRO

INTACTA RR2 PRO™

PONTOS FORTES

- Ampla região de adaptação;
- Estabilidade;
- Excelente desenvolvimento inicial;
- Elevado peso de mil grãos; e
- Ótima rusticidade.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto	S
Galha	S

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.2**
Exigência de fertilidade	**4 (alta)**
Peso de mil grãos	**205 g**
Ramificação	**Média**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível

T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
M4 404 GO Norte	120	180-250 mil
M4 404 TO Sul	120	200-300 mil
M4 405 BA Oeste – Sequeiro	122	200-280 mil
M4 405 BA Oeste – Irrigado	123	180-240 mil
M5 501 PA	118	250-320 mil
M5 501 MA Sul	116	280-320 mil
M5 501 PI Sul	119	280-320 mil
M5 501 TO Norte	118	250-320 mil
M5 501 Campos Lindos TO e Batavo MA	118	250-300 mil
M5 502 PA	118	250-320 mil

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

Pontos importantes para cultivo na região da Micro 501 MA e PI: áreas de alta fertilidade; evitar antecipação da data de semeadura e plantio de risco (com chuvas não consolidadas).

neogen

neo821 i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Potencial produtivo;
- Ótima Rusticidade;
- Bom desempenho em condição de médio potencial;
- Bom desenvolvimento inicial.

LANÇAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	8.2 MAPITO / 7.9 BAHIA
Ciclo médio	110 dias de emergência*
Hábito de crescimento	Indeterminado
Peso de mil grãos	177 g
Porte médio	94 cm
Ramificação	Médio
Exigência de fertilidade	3

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto	S
Galha	S

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
SI Sem Informação

REGIÕES	ÉPOCA DE PLANTIO	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
404 TO SUL	20/10 A 30/11	200-280 MIL
501 TO NORTE	20/10 A 30/11	220-300 MIL
501 TO (C. LINDOS) MA BATAVO	20/10 A 30/11	200-280 MIL
501 MA SUL	30/10 A 05/12	220-300 MIL
501 PI SUL	25/10 A 05/12	220-300 MIL
501 PA SUL	20/10 A 30/11	200-280 MIL
405 BA IRRIGADO	25/09 A 30/11	160-220 MIL
405 BA IRRIGADO	30/10 A 30/1	180-260 MIL

CORDIUS™
Licenciamento de Sementes da Corteva Agriscience

C2740CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Estabilidade produtiva;
- Tolerante ao acamamento; e
- Conkesta Enlist não STS.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Meloidogyne Incognita	MT
Meloidogyne Javanica	MT
Heterodera Glycines	S

RECOMENDAÇÕES

Sensível a nematoide de cisto

DOENÇAS[2]	Resistência
Antracnose	S
Cercosporiose	T
Cancro da haste	MT
Oídio	S
Mancha-alvo	MS
Podridão radicular de *Phytophthora*	S

[2] Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.4**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**
Acamamento	**Tolerante**
Altura de planta	**80 cm**
Cor do hilo	**Marrom-claro**
Cor da flor	**Branca**
Cor da pubescência	**Cinza**
PMS médio[1]	**180 g**

[1] PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

- S Suscetível
- MT Moderadamente Tolerante
- T Tolerante
- MR Moderadamente Resistente
- R Resistente
- MS Moderadamente Suscetível
- SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301	108-113	280-400 mil
302	105-110	280-400 mil
303	113-118	280-400 mil
304	108-113	280-400 mil
401	105-110	280-400 mil
402	103-108	280-400 mil
403	100-105	280-400 mil

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis, utilizar a menor população recomendada.

[1] O ciclo da cultivar poderá sofrer alterações dependendo das condições e manejo utilizado.

CORDIUS™
Licenciamento de Sementes da Corteva Agriscience

C2810CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Bom potencial de engalhamento; e
- Tolerante ao Nematoide de Cisto (raça 3).

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Meloidogyne Incognita	S
Meloidogyne Javanica	S
Heterodera Glycines	T

RECOMENDAÇÕES

Arranque inicial lento

DOENÇAS[2]	Resistência
Antracnose	SI
Cercosporiose	SI
Cancro da haste	SI
Oídio	SI
Mancha-alvo	T
Podridão radicular de Phytophthora	SI
Podridão de Macrophomina	SI

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.1**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**
Acamamento	**Tolerante**
Altura de planta	**80 cm**
Cor do hilo	**Preta imperfeita**
Cor da flor	**Roxa**
Cor da pubescência	**Cinza**
PMS médio[1]	**158 g**

[1]PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

- S Suscetível
- MT Moderadamente Tolerante
- T Tolerante
- MR Moderadamente Resistente
- R Resistente
- MS Moderadamente Suscetível
- SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401	115-120	250-330 mil
402	115-120	250-330 mil
403	115-120	250-330 mil
405	112-118	250-330 mil
501	112-118	250-330 mil

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis, utilizar a menor população recomendada.

[1]O ciclo da cultivar poderá sofrer alterações dependendo das condições e manejo utilizado.

GENÉTICA Soy
Solução Tropical

SOY COMPLETA iPRO

GNS 7901 iPRO

INTACTA RR2 PRO®

PONTOS FORTES

- Tolerância à galha;
- Estabilidade produtiva;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoides;
- Sanidade radicular; e
- Tolerância à macrophomina.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 3 e 14+	R
Cisto raças 1, 5, 6, 9 e 14	MR
Galha	MR
Acamamento	MR

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**7.9**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**
Ciclo	**108 - 127 dias**
Peso de mil grãos	**180 g***
Porte médio	**90 cm***

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301 Norte MS/ Sudoeste GO	120	180-220 mil
302 Sul GO/ MG Baixo/ Norte SP	127	180-220 mil
303 Sudeste GO/ Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba	120	180-220 mil
304 Leste GO/ DF/ Noroeste MG	125	180-220 mil
401 Sul MT/ Sudeste MT	118	240-300 mil
402 BR 163/ Parecis/ Sul de RO	112	240-300 mil
403 Vale do Araguaia/ Xingu	110	240-300 mil
404 Sul TO/ Norte GO/ Noroeste GO	108	240-300 mil
405 Oeste Bahia	116	200-240 mil
501 Sudeste PA/ Sul MA/ Oeste MA/ Norte TO/ Sudeste PI	108	240-300 mil

[1]Ciclo (DAS) na região de adaptação poderá haver variações devido às condições edafoclimáticas.

**Quando a semeadura for realizada fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

***Caso a atividade rural envolva seguro agrícola, o produtor deverá consultar as recomendações presentes nas portarias vigentes do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

TMG 2370 iPRO

INTACTA RR2 PRO™

PONTOS FORTES

- Precocidade;
- Alto vigor vegetativo; e
- Resistência ao Nematoide de Cisto.

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita; Baixo < 500m, Alto> 500m.

IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 3, 9, 10 e 14	R
Cisto raças 4 e 6	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha olho-de-rã	R
Podridão radicular de *Phytophthora*	MR[1]
Pústula bacteriana	R

** É considerado resistente quando IF < 10%. [1] Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

CARACTERÍSTICAS

Maturação relativa	7.0
RNC	TMG2370IPRO
Tipo de crescimento	Semideterminado
Cor da flor	Branca
Cor da pubescência	Cinza
Cor do hilo	Marrom-claro
Exigência de fertilidade	Alta
Acamamento	Mod. resistente
PMG	175 g

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível · T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301 GO Sudoeste | MS Chapadões	105-110	244-289 mil
302 SP Norte	110-115	244-289 mil
302 MG Sul	110-115	222-267 mil
302/3 MG Triângulo (Baixo)	110-115	222-267 mil
303 MG Triângulo e Alto Parnaíba	110-115	222-267 mil
303 GO Sul e Sudeste	105-110	267-289 mil
304 MG | GO PADF	105-110	222-267 mil
401 MT Sul	105-110	289-334 mil
402 MT Médio Norte (BR 163)	95-100	355-422 mil
402 MT Oeste (Parecis)	98-103	355-400 mil
402 RO (Alto)	95-100	355-400 mil
403 MT Vale do Araguaia	95-100	356-422 mil
404 GO Norte	95-100	244-289 mil
405 BA Oeste (irrigado)	90-95	350-425 mil

TMG 22E70 CE

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Precocidade;
- Conkesta Enlist não STS;
- Excelente sanidade foliar; e
- Opção para rotação com algodão.

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita; Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha-alvo	MR
Podridão radicular de *Phytophthora*	MR[1]
Pústula bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	7.0
Hábito de crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Cor do hilo	Marrom Claro
Exigência e fertilidade	Alta
Cor da flor	Branca
Cor da pubescência	Cinza
PMG médio[1]	164 g

[1]PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível | MT Moderadamente Tolerante | R Resistente | MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante | MR Moderadamente Resistente | SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301 MS Norte	106-111	289-355 mil
301 GO Sudoeste | MS Chapadões	106-111	289-355 mil
302 MG Sul	111-116	266-311 mil
302/3 MG Triângulo (Baixo)	111-116	266-311 mil
303 MG Triângulo e Alto Parnaíba	111-116	266-311 mil
401 MT Sul	106-111	200-289 mil
402 MT Médio Norte (BR 163)	95-100	400-444 mil
402 MT Oeste (Parecis)	97-103	311-400 mil
402 RO (Alto)	97-103	311-400 mil

TMG ITAÚBA i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Resistência a Cisto.
- Alta exigência em fertilidade
- Resistência a nematoides e doenças

LANÇAMENTO

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 3	R
Cisto raça 6, 9, 10 E 14+	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da Haste	R
Mancha Alvo	MR
Nematoide de cisto	R E MR
Pústula bacteriana	R

** É considerado resistente quando IF < 10% [1]Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P.sajae

CARACTERÍSTICAS

Maturação relativa	7.9
Tipo de crescimento	Indeterminado
Cor da flor	Branca
Cor da pubescência	Cinza
Cor do hilo	Marrom claro
Exigência em fertilidade	Alta
Acamamento	Resistente
PMG[1]	185g

[1] PMG pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401 MT Sul	112-117	240-340 MIL
402 MT Médio Norte (BR 163)	110-115	260-360 MIL
402 MT Oeste (Parecis)	110-115	260-360 MIL
402 RO (Alto)	110-115	260-360 MIL
402 RO (Baixo)	110-115	220-280 MIL
403 MT Vale do Araguaia	110-115	260-360 MIL
404 GO Norte	120-125	200-300 MIL
404 TO Sul	105-110	200-300 MIL
405 BA Oeste (Sequeiro ou Irrigado)	115-120	220-320 MIL

TMG BÁLSAMO i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Ampla resistência a cisto;
- Resistência ao nematoide R. reniformis; e
- Resistência aos cistos raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14	R
R. Reniformis	R

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Pústula bacteriana	R

** É considerado resistente quando IF < 10%. Evitar semeaduraem áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

CARACTERÍSTICAS

Maturação relativa	7.6
RNC	2331112X
Tipo de crescimento	Determinado
Cor da flor	Roxa
Cor da pubescência	Marrom
Cor do hilo	Preto
Exigência de fertilidade	Alta
Acamamento	Mod. suscetível
PMG[1]	190g

[1] PMG pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível · T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAL/HA)
401 MT Sul	110-115	267-289 mil
402 MT Médio Norte (BR 163)	105-110	244-311 mil
402 MT Oeste (Parecis)	105-112	244-311 mil
402 RO (Alto)	105-112	244-311 mil
403 MT Vale do Araguaia	105-110	244-311 mil

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita; Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

TMG

BRAÚNA

i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Ampla resistência a cisto;
- Ótima rusticidade;
- Ampla proteção para controle de cisto;
- Resistência ao nematoide R. reniformis; e
- Resistência aos cistos raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14.

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
R. Reniformis	R
Cisto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14	R

DOENÇAS	Resistência
Cancro da Haste	R
Podridão Rad. de Fitóftora	R[1]
Pústula Bacteriana	R

** É considerado resistente quando IF < 10% . [1]Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

CARACTERÍSTICAS

Maturação Relativa: 8.2	**8.2**
RNC	**2331212X**
Tipo de Crescimento	**Indeterminado**
Cor da Flor	**Roxa**
Cor da Pubescência	**Cinza**
Cor do Hilo	**Preto imperfeito**
Exigência em Fertilidade	**Média/baixa**
Acamamento	**Mod. suscetível**
PMG[1]	**190 g**

[1]PMG pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401 MT Sul	120-125	178-289 mil
402 MT Médio Norte (BR 163)	115-120	178-289 mil
402 MT Oeste (Parecis)	116-121	178-289 mil
402 RO Alto	115-120	178-289 mil
403 MT Vale do Araguaia	113-118	178-289 mil
404 GO Norte	125-130	180-245 mil
404 TO Sul	105-115	200-245 mil
405 BA Oeste (Sequeiro)	122-127	180-245 mil
501 MA Geral de Balsas e Alto Parnaíba	105-115	200-240 mil
501 MA Região da Batavo	105-115	200-245 mil
501 TO Norte	105-115	200-245 mil
501 PI	105-115	200-245 mil
502 PA Norte	105-115	180-244 mil
502 PA Sul	105-115	180-244 mil
502 MA Norte	105-115	200-245 mil

TMG INGÁ i2X

INTACTA 2 XTEND

PONTOS FORTES

- Não contém a Tecnologia STS;
- Resistência a Cisto.

LANÇAMENTO

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita;
Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 3, 6 e 9	R
Cisto raça 10	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha Olho-de-rã	R
Mancha Alvo	MR
Podridão radicular de fitóftora	R
Pústula bacteriana	R

** É considerado resistente quando IF < 10% . Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

CARACTERÍSTICAS

Maturação relativa	6.9
Tipo de crescimento	Indeterminado
Cor da flor	Branca
Cor da pubescência	Cinza
Cor do hilo	Marrom claro
Exigência em fertilidade	Alta
Acamamento	Resistente
PMG[1]	170g

[1] PMG pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401 MT Sul	103-108	300-400 MIL
402 MT Médio Norte (BR 163)	93-98	350-450 MIL
402 MT Oeste (Parecis)	93-98	350-450 MIL
402 RO (Alto)	93-98	350-450 MIL
402 RO (Baixo)	93-98	350-400 MIL
403 MT Vale do Araguaia	93-98	380-450 MIL
405 BA Oeste (Irrigado)	90-95	350-450 MIL

TMG SUCUPIRA E

Enlist E3 SOJA

PONTOS FORTES

- Super precocidade;
- Manejo de nematoides;
- Não contém a Tecnologia STS;
- Resistência a cisto;
- Controle de plantas daninhas e tigueras.

[1]Ciclo médio em dias da emergência ao ponto de colheita; Baixo < 500m, Alto> 500m.
IMPORTANTE: atentar-se às normas de vazio sanitário.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raças 1, 2, 3, 4, 5, 6,	R
9, 10, 14 e 14+	R

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Mancha Alvo	MR
Pústula bacteriana	MR

** É considerado resistente quando IF < 10% . Evitar semeadura em áreas com alta infestação de patótipos agressivos de P. sojae.

CARACTERÍSTICAS

Maturação relativa	6.7
Tipo de crescimento	Indeterminado
Cor da flor	Branca
Cor da pubescência	Cinza
Cor do hilo	Marrom claro
Exigência em fertilidade	Alta
Acamamento	Resistente
PMG[1]	175g

[1] PMG pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES		CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301	MS Norte	98 - 103	300 - 400 MIL
301	GO Sudoeste | MS Chapadões	98 - 103	320 - 380 MIL
302	SP Norte	100 - 105	320 - 380 MIL
302	MG Sul	100 - 105	320 - 380 MIL
302/3	MG Triângulo (Baixo)	100 - 105	320 - 380 MIL
303	MG Triângulo Alto Parnaíba	100 - 105	320 - 380 MIL
303	GO Sul e Sudeste	98 - 103	320 - 380 MIL
304	MG | GO PADF	98 - 103	320 - 380 MIL
401	MT Sul	93 - 98	380 - 450 MIL
402	MT Médio Norte (BR 163)	90 - 95	380 - 480 MIL
402	MT Oeste (Parecis)	90 - 95	380 - 480 MIL
402	RO Alto	90 - 95	380 - 450 MIL
402	RO Baixo	90 - 95	360 - 450 MIL
403	MT Vale do Araguaia	90 - 95	400 - 480 MIL

STINE

76KA72

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Excelente potencial produtivo;
- Ampla adaptação com estabilidade;
- Elevado PMG;
- Resistência a nematoide de cisto.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas.
Dias após a emergência.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto raça 3, 4, 4+, 5, 10, 14 e 14+	R
Cisto raça 6	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Galha	S

CARACTERÍSTICAS

Peso de mil grãos	180g
Grupo de maturação	7.6 (M4 e M5) e 7.4 (M3)
Cor da flor	Roxa
Porte	Baixo
Cor da pubescência	Cinza
Entrenós	Curtos
Cor do hilo	Marrom claro
Hábito de crescimento	Indeterminado

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível · T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO(DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTA/HA)
M3 301	110	240-300 MIL
M3 302	110	240-300 MIL
M3 303	110	240-300 MIL
M3 304	110	240-300 MIL
M4 401	105	240-300 MIL
M4 402	105	300-350 MIL
M4 403	105	300-350 MIL
M4 404	108	300-350 MIL
M4 405 (BA)	108	300-350 MIL
M5 501	98	300-350 MIL

STINE

79KA72

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo em áreas de médio/alto investimento com ampla adaptação;
- Permite a abertura de plantio;
- Múltipla resistência a Nematoide de Cisto;
- Resistente ao acamamento.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto raça 3, 4, 9, 10, 14, 14+	R
Cisto raça 1, 5, 6	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Galha	S

CARACTERÍSTICAS

Peso de mil grãos	165g
Grupo de maturação	7.9
Cor da flor	Roxa
Porte	Médio
Cor da pubescência	Cinza
Entrenós	Curtos
Cor do hilo	Preto imperfeito
Hábito de crescimento	Indeterminado

S Suscetível

MT Moderadamente Tolerante

T Tolerante

MR Moderadamente Resistente

R Resistente

MS Moderadamente Suscetível

SI Sem Informação

STINE

84KA92

Conkesta E3 SOJA Enlist

PONTOS FORTES

- Estabilidade produtiva em ambientes restritivos;
- Tolerância a Nematoides de Galha e Cisto;
- Resistente ao acamamento;
- Ampla adaptação.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDES	Resistência
Cisto raça 3, 4, 6, 10, 14+	R
Cisto raça 1, 9	MR

DOENÇAS	Resistência
Cancro da haste	R
Galha *(Meloidogyne incognita)*	MR

CARACTERÍSTICAS

Peso de mil grãos	**160g**
Grupo de maturação	**8.2 (M4) e 8.0 (M5)**
Cor da flor	**Branca**
Porte	**Médio**
Cor da pubescência	**Cinza**
Entrenós	**Curtos**
Cor do hilo	**Marrom claro**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**

S Suscetível
MT Moderadamente Tolerante
R Resistente
MS Moderadamente Suscetível
T Tolerante
MR Moderadamente Resistente
SI Sem Informação

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência

SoyTech®

ST 711 i2X

SIM STS · INTACTA 2 XTEND · BASF We create chemistry

PONTOS FORTES

- Multirresistente à nematoide de cisto;
- Ampla adaptação geográfica;
- Tolerante ao acamamento.

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

STS™ (Tolerante a Sulfonilureias).

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raças 9,10, e 14	MR

DOENÇAS	Resistência
Podridão R. de Fitóftora	R
Cancro da Haste	MR
Necrose da Haste	MR
Mancha Olho-de-Rã	MR

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	7.1
Peso de mil grãos	172g
Hábito de crescimento	Indeterminado
Pubescência	Roxa
Flor	Cinza
Hilo	Preto imperfeito

S Suscetível · MT Moderadamente Tolerante · T Tolerante · MR Moderadamente Resistente · R Resistente · MS Moderadamente Suscetível · SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301 Chapadões	?	280-300 mil
301 MS Norte		280-300 mil
301 / 401 Sudoeste GO		280-320 mil
302 SP Baixa Altitude		240-280 mil
302 / 303 Pontal MG/ Sul GO		280-320 mil
303 Triangulo MG/ Sudeste GO		260-280 mil
304 GO / MG		260-300 mil
404 Norte GO		280-320 mil
401 Grande Primavera		300-320 mil
401 MT Sul		300-320 mil
402 BR 163		320-340 mil
402 Parecis		320-340 mil
402 Rondônia		280-300 mil
403 Vale do Araguaia		360-380 mil
405 Bahia		380-400 mil

SoyTech®

ST 745 i2X

BSA74483I2X

INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

PONTOS FORTES

- Tolerante ao acamamento;
- Ampla adaptação geográfica;
- Permite abertura de plantio.

LANÇAMENTO

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3	R
Cisto raças 9,10, e 14	MR

DOENÇAS	Resistência
Podridão R. de Fitóftora	MR
Cancro da Haste	MR
Necrose da Haste	R
Mancha Olho-de-Rã	R
Pústula Bacteriana	R

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	7.4
Peso de mil grãos	170g
Hábito de crescimento	Indeterminado
Pubescência	Cinza
Flor	Roxa
Hilo	Marron claro

- S Suscetível
- MT Moderadamente Tolerante
- T Tolerante
- MR Moderadamente Resistente
- R Resistente
- MS Moderadamente Suscetível
- SI Sem Informação

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
301 Chapadões	?	260-280 mil
304/ 401 Sudoeste GO		260-300 mil
302/ 303 Pontal Sul GO		260-300 mil
303 Triangulo MG		260-300 mil
304 GO / MG		280-320 mil
304 GO / MG (Irrigado)		240-280 mil
401 MT Sul		280-300 mil
401 Grande Primavera		280-320 mil
402 Parecis		320-340 mil
402 BR 163		320-340 mil
402 Rondônia		280-300 mil
403 Vale do Araguaia		320-340 mil
404 Norte GO		300-340 mil

SoyTech®

ST 807 i2X

BSA80777I2X

SIM STS · INTACTA 2 XTEND · BASF We create chemistry

PONTOS FORTES

- Elevado peso de grãos;
- Alto potencial produtivo;
- Sistema radicular agressivo.

LANÇAMENTO

PRINCIPAIS RESPOSTAS

NEMATOIDE	Resistência
Cisto raça 3 e 10	R
Cisto raças 6 e 14	MR

DOENÇAS	Resistência
Podridão R. de Fitóftora	MR
Cancro da Haste	MR
Necrose da Haste	MR

CARACTERÍSTICAS

Grupo de maturação	**8.0**
Peso de mil grãos	**209 g**
Hábito de crescimento	**Indeterminado**
Pubescência	**Cinza**
Flor	**Branca**
Hilo	**Marron claro**

S Suscetível · T Tolerante · MT Moderadamente Tolerante · MS Moderadamente Suscetível

R Resistente · SI Sem Informação · MR Moderadamente Resistente

REGIÕES	CICLO (DIAS[1])	POPULAÇÃO (PLANTAS/HA)
401 MT Sul	?	200-220 mil
401 Grande Primavera		200-220 mil
402 Parecis		220-240 mil
402 BR 163		220-240 mil
403 Vale do Araguaia		240-280 mil

[1]Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população indicada de plantas.

STS™ (Tolerante a Sulfonilureias).

Escritório
Rua Dom Pedro II, 332 Centro
CEP 78700-220 - Rondonópolis-MT
66 3411-3600

UBS
Fazenda Bahia, Rodovia BR 364 KM 118
+ 6 KM à esquerda - Pedra Preta-MT
66 3411-3600 | 66 3411-3640

polatosementes **comercial@polatosementes.com.br**
www.polatosementes.com.br